

---

# TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DEL TABAQUISMO

---

# PRINCIPALES TRATAMIENTOS

---

- ❑ TERAPIA SUSTITUTIVA DE NICOTINA (TSN)
  - ❑ BUPROPIÓN (ZYNTABAC)
  - ❑ VARENICLINA (CHAMPIX)
-

# Terapia sustitutiva con nicotina

## ¿En qué consiste?

**Administración de nicotina pura por una vía diferente a la del consumo de cigarrillos**

## ¿Con qué finalidad?

- 1º. Facilitar el proceso de deshabituación**
- 2º. Mitigar al máximo los síntomas desagradables de la abstinencia que manifiestan los fumadores al dejar de fumar**



# Terapia sustitutiva con nicotina ¿A quién?

---

- Todos los fumadores



- Fumadores “moderados” < 10-15 cig./día
  - Dosis inicial más baja

# Terapia sustitutiva con nicotina

## Precauciones

- **Embarazo y lactancia**

- Intentar sin TSN
- Valorar riesgo/beneficio



- **Enfermedad cardiovascular**

(No se ha mostrado como factor de riesgo)

- Valorar riesgo/beneficio en:
  - ☐ Postinfarto inmediato (4 semanas)
  - ☐ Arritmia grave
  - ☐ Angina inestable

- **Úlcera gastroduodenal activa**

# Terapia sustitutiva con nicotina ¿Parches o chicles?

---

- **Ambas formas son eficaces**
- **Parches:** muy apropiados para Atención Primaria
  - Utilización más fácil
  - Menor tiempo de adiestramiento
- **Chicles:** utilizar si
  - Preferencia del fumador
  - Fracaso previo con parches
  - Fuerte componente asociativo
  - Intolerancia al parche



# Terapia sustitutiva con nicotina

## Efectos secundarios: Parches

---

- Reacción cutánea local (prurito, eritema, exantema)
  - Leve y autolimitada; puede empeorar
    - TRATAMIENTO
      - Rotar posición
      - Corticoides tópicos
- Cefalea, mialgias, mareos, dispepsia



# Terapia sustitutiva con nicotina

## Contraindicaciones: Parches

---

- ☐ Enfermedades dermatológicas generalizadas





# Terapia sustitutiva con nicotina

## Consideraciones: Parches

- “NO SE PUEDE FUMAR”
- APLICAR EN ZONAS SIN VELLO
- NO APLICAR EN ZONAS DE PURA GRASA
- COMPATIBLE CON CUALQUIER ACTIVIDAD



# Terapia sustitutiva con nicotina

## Consideraciones chicles

---

- Masticación lenta
- Liberación lenta de nicotina (2-3 minutos)
- Compatible con casi cualquier actividad
- **!!!Es un medicamento!!!**
- Defecto frecuente:
  - **!!!INFRAUTILIZACIÓN!!!**
    - Número de piezas/día
    - Días de tratamiento

# Terapia sustitutiva con nicotina

## Efectos secundarios: Chicles

---

- Úlceras bucales (linguales y orofaríngeas)
- Dolor de garganta
- Dolor mandibular
- Molestias dentales
- Mal sabor de boca



En general, leves y transitorios; algunos se atenúan con una correcta utilización

- Cefalea, mareos, dispepsia, mialgia

# Terapia sustitutiva con nicotina

## Contraindicaciones: Chicles

---

- Inflamación orofaríngea
- Patología articulación témporo-mandibular
- Problemas dentarios



# BUPROPIÓN

---

- ❑ Es un Antidepresivo de 2ª generación.
  - ❑ Indicado en pacientes que quieren dejar de fumar. Menor ganancia peso que TSN
  - ❑ Inhibe de forma selectiva la recaptación neuronal de NA y Dopamina, aumentando sus niveles en los núcleos Acumbens y Ceruleus.
  - ❑ Precisa una semana para alcanzar niveles plasmáticos estables y ser eficaz.
-

# BUPROPIÓN

---

## □ MODO DE EMPLEO:

- Iniciar con 1 comprimido de 150 mg por la mañana los 5 primeros días. Seguir con 2 comprimidos al día separados al menos 8 horas y tomando el último al menos 4 horas antes de acostarse, durante 7-9 semanas.
  - Dejar de fumar a partir de la 2ª semana de tratamiento.
  - Suspender si se vuelve a fumar.
-

# BUPROPIÓN

---

## ❑ EFECTOS SECUNDARIOS:

- ❑ CONVULSIONES . Insomnio. Sequedad de boca. Nauseas. Cefalea. Manifestaciones alérgicas cutáneas. Inestabilidad.

## ❑ PRECAUCIONES:

- ❑ Antidepresivos, Antiepilépticos, Haloperidol, Beta-bloqueantes y Antiarrítmicos. Cuidado con fármacos que disminuyen el umbral convulsivo (Haloperidol, Teofilina, Corticoides, Quinolonas, Antidepresivos). Levodopa.
- ❑ Situaciones que reducen el umbral convulsivante (traumatismo craneoencefálico, antecedentes de alcoholismo)

## ❑ CONTRAINDICACIONES:

- ❑ Crisis convulsivas. Bulimia. Anorexia nerviosa. Trastorno Bipolar. Cirrosis hepática. IMAO. Hipersensibilidad. Embarazo, lactancia .
-

# BUPROPIÓN EN SITUACIONES ESPECIALES

---

## ☐ CARDIOPATÍAS:

- No evidencia de efectos secundarios.

## ☐ FUMADORES DE 65 ó MAS AÑOS:

- Dosis única de 150 mg al día.

## ☐ INSUFICIENCIA RENAL:

- Dosis única de 150 mg/día vigilando posibles efectos secundarios.

## ☐ INSUFICIENCIA HEPÁTICA:

- 150 mg/día. Contraindicado en Cirrosis hepática.
-



# VARENICLINA

---

- ❑ Es un Agonista parcial/Antagonista de los receptores de la Nicotina ( $\alpha 4\beta 2$ ).
    - AGONISTA PARCIAL: Alivia los síntomas de abstinencia.
    - ANTAGONISTA: Reduce los efectos gratificantes y de refuerzo del fumar.
  - ❑ Precisa 4 días para alcanzar niveles plasmáticos estables y ser eficaz.
  - ❑ Se elimina exclusivamente por Riñón.
-

# VARENICLINA

---

## □ MODO DE EMPLEO:

- Iniciar con un comprimido de 0.5 mg al día durante 3 días. Seguir con un comprimido de 0.5 mg cada 12 horas durante 4 días. Seguir con un comprimido de 1 mg cada 12 horas durante 12 semanas.
  - Dejar de fumar a partir de la 2ª semana de tratamiento.
  - En algunos casos se puede plantear alargar el tratamiento hasta 24 semanas.
-

# VARENICLINA

---

## ☐ EFECTOS SECUNDARIOS:

- ☐ Náuseas (28%). Sueños anómalos. Insomnio. Cefalea. Mareo. Dispepsia. Vómitos. Diarrea. Sequedad de boca. Disgeusia.
- ☐ SUICIDIO. Depresión. IAM.

## ☐ INTERACCIONES:

- ☐ NINGUNA. Dejar de fumar puede alterar metabolismo de Teofilina, Warfarina e Insulina.

## ☐ CONTRAINDICACIONES:

- ☐ Alergia al producto.
  - ☐ Embarazo, Lactancia y menores de 18 años.
-

# VARENICLINA EN SITUACIONES ESPECIALES

---

## ☐ CARDIOPATÍAS:

- Se han reportado algunos casos de ataques cardíacos.

## ☐ PERSONAS MAYORES:

- No precisa ajustar dosis.

## ☐ INSUFICIENCIA RENAL:

- Reducir dosis a 1 mg al día si  $ClCr < 30$  mil/minuto.

## ☐ INSUFICIENCIA HEPÁTICA:

- No precisa ajustar dosis.
-